

गाय एवम् भैंसों में टीकाकरण

8.	खुरपका मुंहपका + गलघोटू + लंगड़ी रोग/बुखार	4 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात्	प्रति 12 माह बाद	3ml मांसपेशि यों के अंदर (I/M)	रक्षा- ट्राईओवेक टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	
9.	खुरपका मुंहपका + गलघोटू	4 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात्	प्रति 12 माह बाद	3ml मांसपेशि यों के अंदर (I/M)	रक्षा- वायोओवेक टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	
10.	गलघोटू + लंगड़ी रोग/बुखार	6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	2ml त्वचा के नीचे (S/C)	रक्षा एच.एस. एंड बी.क्यू. (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	

टीकाकरण के समय सावधानियाँ

- टीके के इन्जेक्शन में भरने से पहले शीशी को अच्छी तरह से हिला लें जिससे सभी पशुओं में टीके की उचित मात्रा पहुँचे ।
- टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच ही संरक्षित एवं संग्रहित करें । किसी भी परिस्थिति में टीकों को जमने न दें । जमे हुये टीके को वैज्ञानिक विधी से नष्ट कर दें ।
- कुछ अपवाद में टीके लगाने पर ऐलर्जी की शिकायत हो सकती हैं। इन परिस्थिति में एनहिस्टामिन का प्रयोग करें।
- बीमार पशुओं को टीका न लगायें।

संकलनकर्ता : डॉ राजीव सिंह, डॉ राजेश अग्रवाल एवं डॉ आर.के. भारद्वाज



पशु औषधि विभाग

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय

शर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

रणवीर सिंह पुरा जम्मू

181102

गाय एवम् भैंसों में टीकाकरण

क्र. स.	बिमारी का नाम	टीकाकरण की उम्र	पुनः टीकाकरण	टीके की मात्रा एवम् विधि	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
1.	खुरपका-मुंहपका रोग	प्रथम टीका 4 माह की आयु पर	प्रति 6 माह पर	5-10ml त्वचा के नीचे (S/C)	खुरपका मुंहपका टेट्रावैलेंट टीका (इन्टरवेट) खुरपका मुंहपका ट्राइवैलेंट टीका (इन्टरवेट) रक्षा - खुरपका मुंहपका टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)- 3ml त्वचा के नीचे (S/C) रक्षा ओवेक -2ml त्वचा के नीचे (S/C)	पुनः टीकाकरण प्रति 6 माह बाद
2.	गलघॉट्ट	प्रथम टीका 4-6 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 3-6 माह पश्चात्	प्रति 12 माह बाद	2 ml त्वचा के नीचे (S/C)	एच.एस. टीका (इन्टरवेट) रक्षा- एच.एस. टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले

3.	लंगड़ी रोग/बुखार	प्रथम टीका 6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	2 ml त्वचा के नीचे (S/C)	बी.क्यू. टीका (इन्टरवेट) रक्षा- बी.क्यू. टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले
4.	एंथ्रेक्स	प्रथम टीका 6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	1ml त्वचा के नीचे (S/C)	एंथ्रेक्स स्पोर टीका (इन्टरवेट) रक्षा-एंथ्रेक्स टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल) 1ml मांसपेशियों के अंदर / त्वचा के नीचे (I.M/S.C.)	वर्षा ऋतु से पहले स्थानिक क्षेत्र में
5.	ब्रसैलोसिस	4-8 माह की आयु पर	----	5 ml त्वचा के नीचे (S/C)	ब्रसैलोसिस टीका (इन्टरवेट) ब्रुवैक्स टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)@ 2ml त्वचा के नीचे (S/C)	स्थानिक क्षेत्र में टीकाकरण केवल मादा बछड़ों में
6.	थाइलिरियता	2 माह और उससे अधिक आयु पर	3 वर्ष	3 ml त्वचा के नीचे (S/C)	रक्षावेक- टी टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	गाभिन पशुओं में टीकाकरण नहीं करते
7.	थानैला रोग				हिपरामेस्टिवेक (हिपरा लैब)	गाभिन पशुओं में किसी भी समय टीका लगा सकते हैं