

7.	भेड़ चेचक रोग	प्रथम टीका 3 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	शीप पॉक्स टीका (इन्टरवेट) 1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) रक्षा-एसपी (इंडियन इम्युनोलाजिकल) 1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	
8.	पी.पी.आर	4 माह और उससे अधिक आयु पर	3 वर्ष के बाद	1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	रक्षा-पी.पी.आर (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले

टीकाकरण के समय सावधानियाँ

- टीके के इन्जेक्शन में भरने से पहले शीशी को अच्छी तरह से हिला लें जिससे सभी पशुओं में टीके की उचित मात्रा पहुँचे।
- टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच ही संरक्षित एवं संग्रहित करें। किसी भी परिस्थिति में टीकों को जमने न दें। जमे हुए टीके को वैज्ञानिक विधि से नष्ट कर दें।
- कुछ अपवाद में टीके लगाने पर ऐलर्जी की शिकायत हो सकती है। इन परिस्थिति में एनहिस्टामिन का प्रयोग करें।
- बीमार पशुओं को टीका न लगाएं।

संकलनकर्ता :
डॉ० राजीव सिंह एवं डॉ० राजेश अग्रवाल

भेड़ एवं बकरी में टीकाकरण



पशु औषधि विभाग
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय
शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
रणवीर सिंह पुरा, जम्मू - 181102

भेड़ एवं बकरी में टीकाकरण

क्र. सं.	बिमारी का नाम	टीकाकरण की उम्र	पुनः टीकाकरण	टीके की मात्रा एवं विधि	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
1.	खुरपका— मुंहपका रोग	प्रथम टीका 4 माह की आयु पर	प्रति 6 माह पर	1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) मांसपेशियों के अंदर (I/M)	बोविलिस एफ.एम.डी. जेल, एफ.एम.डी बोविलिस क्लोवेक्स (इन्टरवेट) मांसपेशियों के अंदर (I/M) रक्षा — खुरपका मुंहपका टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल) — 1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) रक्षा ओवेक 1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	
2.	गलधोंटू	प्रथम टीका 4—6 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 3—6 माह पश्चात्	प्रति 12 माह पर	2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	एच.एस. टीका (इन्टरवेट) रक्षा—एच.एस. टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले
3.	खुरपका मुंहपका+ गलधोंटू+ लंगड़ी रोग/ बुखार	4 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात्	प्रति 12 माह पर	1 मि.ली. मांसपेशियों के अंदर (I/M)	रक्षा—ट्राईओवेक टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	

भेड़ एवं बकरी में टीकाकरण

4.	खुरपका, मुंहपका+ गलधोंटू	4माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात्	प्रति 12 माह बाद	1 मि.ली. मांसपेशियों के अंदर (I/M)	रक्षा—वायोओवेक टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	
5.	एंथ्रेक्स	प्रथम टीका 6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	एंथ्रेक्स स्पोर टीका (इन्टरवेट) रक्षा—एंथ्रेक्स टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल) 1 मि.ली. मांसपेशियों के अंदर /त्वचा के नीचे (I.M / S.C.)	वर्षा ऋतु से पहले स्थानिक क्षेत्र में
6.	इन्टेरोट्रिस्मिया	प्रथम टीका 4—6 सप्ताह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 3—6 9 सप्ताह पश्चात्	प्रति 6 माह बाद	5 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) (टाइप सी+डी)	बोविलिस एमसीवी (इन्टरवेट) 2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) (टाइप डी)	त्वचा के नीचे (S/C) बोविलिस ईटीवी (इन्टरवेट) 2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) रक्षा—इटी (इंडियन इम्युनोलाजिकल) 2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)