

9.	खुरपका मुंहपका+ गलघोंटू	4 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात	प्रति 12 माह बाद	3 मि.ली. मांसपेशियों के अंदर (I/M)	रक्षा—वायोओवेक टीका (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	
10.	गलघोंटू+ लंगड़ी रोग/ बुखार	6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	रक्षा—एच.एस. एंड बी.क्यू. (इंडियन इम्युनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले

टीकाकरण के समय सावधानियाँ

- टीके के इन्जेक्शन में भरने से पहले शीशी को अच्छी तरह से हिला लें जिससे सभी पशुओं में टीके की उचित मात्रा पहुँचे।
- टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच ही संरक्षित एवं संग्रहित करें। किसी भी परिस्थिति में टीकों को जमने न दें। जमे हुए टीके को वैज्ञानिक विधि से नष्ट कर दें।
- कुछ अपवाद में टीके लगाने पर ऐलर्जी की शिकायत हो सकती है। इन परिस्थिति में एनहिस्टामिन का प्रयोग करें।
- बीमार पशुओं को टीका न लगाएं।

संकलनकर्ता :

डॉ० राजीव सिंह, डॉ० राजेश अग्रवाल एवं डॉ० रवलीन कौर

गाय एवं भैसों में टीकाकरण



पशु औषधि विभाग

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय
शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
रणवीर सिंह पुरा, जम्मू - 181102

गाय एवं भैंसों में टीकाकरण

क्र. सं.	बिमारी का नाम	टीकाकरण की उम्र	पुनः टीकाकरण	टीके की मात्रा एवं विधि	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
1.	खुरपका—मुंहपका रोग	प्रथम टीका 4 माह की आयु पर	प्रति 6 माह पर	5–10 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	खुरपका मुंहपका ट्रेट्रावैलेंट टीका (इन्टरवेट) खुरपका मुंहपका ट्राइवैलेंट टीका (इन्टरवेट) रक्षा—खुरपका मुंहपका टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)—3 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C) रक्षा ओवेक-2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	पुनः टीकाकरण प्रति 6 माह बाद
2.	गलधोंटू	प्रथम टीका 4–6 माही की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 3–6 माह पश्चात्	प्रति 12 माह पर	2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	एच.एस. टीका (इन्टरवेट) रक्षा—एच.एस. टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले
3.	लंगड़ी रोग / बुखार	प्रथम टीका 6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह पर	2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	बी.क्यू. टीका (इन्टरवेट) रक्षा—बी.क्यू. टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	वर्षा ऋतु से पहले

गाय एवं भैंसों में टीकाकरण

4.	एंथ्रेक्स	प्रथम टीका 6 माह की आयु पर	प्रति 12 माह बाद	1 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	एंथ्रेक्स स्पॉर टीका (इन्टरवेट) रक्षा—एंथ्रेक्स टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल) 1 मि.ली. मांसपेशियों के नीचे (I.M / S.C.)	वर्षा ऋतु से पहले स्थानिक क्षेत्र में
5.	ब्रुसैलोसिस	4–8 माह की आयु पर	----	5 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	ब्रैसैलोसिस टीका (इन्टरवेट) ब्रुवैक्स टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल) 2 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	स्थानिक क्षेत्र में टीकाकरण केवल मादा बछड़ों में
6.	थाइलिरियोसिस	2 माह और उससे अधिक आयु पर	3 वर्ष	3 मि.ली. त्वचा के नीचे (S/C)	रक्षावेक—टी टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	गाभिन पशुओं में टीकाकरण नहीं करते
7.	थानैला रोग				हिपररामेस्टिवेक (हिपरा लैब)	गाभिन पशुओं में किसी भी समय टीका लगा सकते हैं
8.	खुरपका मुंहपका+ गलधोंटू+ लंगड़ी रोग / बुखार	4 माह की आयु पर अनुवर्धक प्रथम टीके के 9 माह पश्चात्	प्रति 12 माह बाद	3 मि.ली. मांसपेशियों के अंदर (I/M)	रक्षा—ट्राईओवेक टीका (इंडियन इम्यूनोलाजिकल)	